arXiv:1010.3418v2 [math.AP] 19 Aug 2011

X- и Y-инварианты дифференциальных операторов с частными производными на плоскости

Екатерина Шемякова

Аннотация

В работе рассматривается классическая проблема компьютерной алгебры – символьное решение дифференциальных уравнений. А именно, широко используемые теоремы Дарбу о преобразованиях гиперболических операторов на плоскости с помощью дифференциальных подстановок переносятся в пространство инвариантов. Вводятся X- и Y-инварианты для таких операторов как решения некоторых уравнений записанных в терминах инвариантов Лапласа самого оператора L относительно калибровочных преобразований. Получены явные формулы преобразований множеств X- и Y-инвариантов при преобразованиях Дарбу.

1 Введение

Теория преобразований Дарбу для линейных гиперболических уравнений второго порядка на плоскости является классикой символьных алгоритмов и имеет многочисленные приложения: для символьных решений задач классической дифференциальной геометрии [2, 6], теории интегрируемых систем [20, 15], для исследования нелинейных уравнений интегрируемых по Дарбу [17, 1, 7, 8]. Получены многочисленные обобщения классической теории Дарбу как для гиперболических задач (для систем уравнений на плоскости [18, 19, 21, 12], для уравнений с более чем двумя независимыми переменными [4, 5, 13], так и для негиперболических: [11, 10, 9, 22].

В данной работе мы возвращаемся к классическим для теории Дарбу гиперболическим операторам второго порядка, т.е. операторам вида

$$L = D_x D_y + a(x,y)D_x + b(x,y)D_y + c(x,y) \ . \qquad (1)$$

Пусть $u = u(x,y)$, $L(u) = 0$, M – линейный дифференциальный оператор с частными производными, и $v(x,y) = Mu$. В общем случае такое v будет удовлетворять переопределенной системе линейных дифференциальных уравнений, и лишь при особом выборе M мы получаем только одно новое уравнение: $L_1 v = 0$, где L_1 того же вида что и L, (1), но с измененными коэффициентами $a_1(x,y)$, $c_1(x,y)$, $b_1 \equiv b$. В таком случае мы имеем *дифференциальное преобразование* [22] оператора L в L_1 с помощью M, и для некоторого оператора M_1 имеет место равенство

$$M_1 \circ L = L_1 \circ M \ , \qquad (2)$$

задающее левое наименьшее общее кратное $lLCM(L,M)$ в кольце $K[D] = K[D_x, D_y]$ линейных дифференциальных операторов на плоскости.

Известно [3, Ch. VIII], что в случае общего положения все такие операторы M описываются в терминах одного или двух частных решений уравнения $L(z) = 0$. Возможны и вырожденные случаи, среди которых и классическое преобразование Лапласа, для задания которого требуется лишь знание коэффициентов оператора (1). Соотношение (2) для “сплетающего оператора” M также широко использовалось при изучении интегрируемых задач [16, 14].

В данной работе мы переносим классические результаты Дарбу о преобразованиях гиперболических операторов на плоскости с помощью дифференциальных подстановок в пространство инвариантов. Согласно Дарбу любое дифференциальное преобразование может быть представлено в виде последовательности дифференциальных преобразований простейшего вида, т.е. таких что M – оператор первого порядка и содержит операторы дифференцирования только по одной переменной (мы называем их X- и Y-преобразования Дарбу). Так как частные решения z уравнения $L(z) = 0$ используются для построения дифференциальных преобразований, мы рассматриваем инварианты R и Q, (6) пар (L,z) вместо обыкновенно рассматриваемых порождающих инвариантов h и k самого оператора L относительно калибровочных (см. определение в секции 2) преобразований. Функции Q и R можно построить по z, и обратно, по R и Q можно построить z.

Мы показываем, что каждую из функций R и Q можно задать как решение некоторого уравнения ((7) и (8)) с коэффициентами зависящими только от h и k, то есть уравнение одно для каждого класса эквивалентности операторов L. Решения этих уравнений мы называем X- и Y-инвариантами. Свойства X- и Y-инвариантов показывают, что введенные понятия интересны и могут быть полезными для развития методов Дарбу и их обобщений.

Автор благодарит профессора С.П.Царева за полезные замечания.

2 Основные определения

Пусть K – дифференциальном поле K характеристики ноль с коммутирующими дифференцированиями ∂_x, ∂_y, $K[D] = K[D_x, D_y]$ – кольцо $K[D] = K[D_x, D_y]$ линейных операторов с частными производными с коэффициентами из K, где D_x, D_y соответствуют дифференцированиям ∂_x, ∂_y.

Операторы $L \in K[D]$ имеют вид $L = \sum_{i+j=0}^{d} a_{ij} D_x^i D_y^j$, где $a_{ij} \in K$. Многочлен $\mathrm{Sym}_L = \sum_{i+j=d} a_{ij} X^i Y^j$ формальных переменных X, Y назовем (главным) *символом* L.

Поле K будем предполагать дифференциально замкнутым, т.е. содержащим решения (нелинейных в общем случае) дифференциальных уравнений с коэффициентами из K.

Пусть K^* – множество обратимых элементов из K. Для $L \in K[D]$ и каждого $g \in K^*$ рассмотрим калибровочное [1] преобразование

$$L \to L^g = g^{-1} \circ L \circ g \ . \tag{3}$$

Тогда дифференциально-алгебраическое выражение I от коэффициентов оператора L и их производных называется *инвариантом* относительно этих калибровочных преобразований, если оно не меняется при этих преобразованиях. Простейшие примеры инвариантов – коэффициенты символа оператора. Порождающим множеством инвариантов называется набор инвариантов, такой, что любой дифференциальный инвариант может быть выражен через инварианты этого набора и их производные.

---

[1] в англ.gauge transformation

3 X- и Y-инварианты

Известно [3], что функции

$$h = ab + a_x - c\ ,\ \ k = ab + b_y - c \tag{4}$$

образуют порождающее множество дифференциальных инвариантов для операторов L вида (1) относительно калибровочных преобразований (3). Соответствующее преобразование ядер, $\mathrm{Ker}(L) \to \mathrm{Ker}(L')$:

$$z \mapsto z' = \frac{z}{g}\ . \tag{5}$$

Функции h и k называют инвариантами Лапласа.

Далее мы будем рассматривать калибровочные преобразования пар (z, L), где $z \in \mathrm{Ker}\, L$.

Лемма 3.1. *Функции*

$$R(b,z) = R = -b - \frac{z_x}{z} \quad \text{и} \quad Q(a,z) = Q = -a - \frac{z_y}{z} \tag{6}$$

являются инвариантами для пар (z, L), $z \neq 0$ относительно калибровочных преобразований.

Доказательство. Достаточно выписать формулы преобразований коэффициентов операторов L вида (1) и использовать (5). ☐

Функции R и Q обладают примечательным свойством: они удовлетворяют уравнениям, записанным только в терминах h и k. Таким образом, уравнения не содержат z.

Утверждение 3.2. *Пусть $R = r \neq 0, Q = q \neq 0$ получены по формулам (6) из некоторого $z \in \mathrm{Ker}\, L, z \neq 0$, тогда верны соотношения*

$$h - k - r_y + \left(\frac{k}{r}\right)_x + (\ln r)_{xy} \ = \ 0\ , \tag{7}$$

$$h - k + q_x - \left(\frac{h}{q}\right)_y - (\ln q)_{xy} \ = \ 0\ , \tag{8}$$

где h и k – инварианта Лапласа (4) оператора L.

Доказательство. Равенства проверяются подстановкой. ☐

Определение 3.3. Решения r и q уравнений (7) и (8) мы назовем X- и Y-инвариантами соответственно.

Лемма 3.4. *Каждому X- (соотв. Y-) инварианту r (соотв. q) соответствует только одно (с точностью до умножения на константу) z такое, что $z \in \operatorname{Ker} L$ и $r = -b - z_x/z$ (соотв. $q = -a - z_y/z$). То есть*

$$\begin{gathered} z = f(y)e^{-\int b+r \ dx} \\ \left(\textit{соотв.} \quad z = g(x)e^{-\int a+q \ dy} \right) \ , \end{gathered} \tag{9}$$

где $f(y)$ и $g(x)$ единственны с точностью до константы [2].

Доказательство. Пусть r – X-инвариант некоторого оператора L, (1). Пусть $z = f(y)e^{-\int_0^x b+r \ dx}$. Здесь мы для краткости не вводим новую переменную для интегрирования. Таким образом, $f(y)$ – выделенная “неопределенность” интегрирования по x. Докажем, что можно подобрать $f(y)$ так, что $z \in \operatorname{Ker} L$.

Выразим коэффициенты $c = c(x,y)$ и $b = b(x,y)$ через инварианты Лапласа h и k, (4) оператора L: $c = -h+ab+a_x$ и $b = \int k-h+a_x \, dy$, и $a = a(x,y)$. В выражении для b содержится неопределенность (произвольная функция от x), но это не влияет дальнейшие вычисления, так в них участвует только b_y.

Выразим h из равенства (7). Подставим эти выражения в выражение для z. Тогда равенство $L(z) = 0$ имеет вид

$$f(y)A + (f(y))_y - f(y)\int_0^x A_x \ dx = 0 \ ,$$

где

$$A = A(x,y) = \frac{k}{r} + \frac{r_y}{r} + a \ .$$

Так как $\int_0^x A_x \ dx = A(x,y) - A(0,y)$, то имеем

$$(f(y))_y + f(y)A(0,y) = 0 \ .$$

Отсюда $f(y)$ находится однозначно с точностью до умножения на константу, и, как видно, действительно, является функцией зависящей только от переменной y.

---

[2] т.е. $f(y)$ и $g(x)$ здесь не параметры, а определенные функции

Из условия $r = -b - z_x/z$ видим, что любое такое z, если существует, имеет вид $z = f(y)e^{-\int_0^x b+r\ dx}$, что и доказывает единственность.

Утверждение для q (Y-инварианта оператора L) доказывается аналогично. ☐

Таким образом, доказано важное свойство X- и Y- инвариантов: множество всех R, полученных из $z \in \operatorname{Ker} L$, $z \neq 0$, совпадает с множеством решений r уравнения (7), т.е. с множеством X-инвариантов (аналогично для Q, q и Y-инвариантов). То есть X- и Y- инварианты можно рассматривать как “проективизацию” пространства решений $L(z) = 0$.

Следствие 3.5 (связь между X- и Y- инвариантами)**.** *Между X- и Y-инвариантами существует взаимно-однозначное соответствие.*

Такие пары X- и Y- инвариантов будем называть “соответствующими”. Они удовлетворяют соотношению

$$r_y - q_x = h - k \ , \tag{10}$$

где h и k – инварианты Лапласа (4) оператора L.

Доказательство. Пусть r – X-инвариант, тогда по Лемме 3.4 существует только одно (с точностью до умножения на константу) $z \in \operatorname{Ker} L$ такое, что $r = -b - z_x/z$. Используя это z строим Y-инвариант $q = -a - z_y/z$. Отметим, что при умножении z на константу q не изменится, таким образом он единственный для данного r.

Перекрестно дифференцируя имеющиеся равенства $r = -b - z_x/z$ и $q = -a - z_y/z$, получаем (10).

Точно такое же соотношение получается, если по данному Y-инварианту q построить, используя Лемму 3.4, $z \in \operatorname{Ker} L$ такое, что $q = -a - z_y/z$, а по z построить X-инвариант $r = -b - z_x/z$. ☐

4 Свойства X- и Y- инвариантов

Пусть

$$\operatorname{Ker}_X(L) = \operatorname{Ker}_X(h,k) \quad (\text{соотв.} \quad \operatorname{Ker}_Y(L) = \operatorname{Ker}_Y(h,k))$$

– множество X- (соотв. Y-) инвариантов оператора L с порождающими инвариантами (4).

Пусть $z \in \operatorname{Ker} L, z \neq 0$, r и q – соответствующие X- и Y-инварианты, тогда, согласно Дарбу [3], для оператора

$$M = D_x - \frac{z_x}{z} = D_x + r + b \tag{11}$$

существуют единственно определенные операторы M_1 и L_1 такие, что выполняется (2). Аналогично, для оператора

$$M = D_y - \frac{z_y}{z} = D_y + q + a$$

существуют единственно определенные операторы M_1 и L_1 такие, что выполняется (2). Такие дифференциальные преобразования назовем X- и Y-преобразования Дарбу соответственно. Такие преобразования дают $\mathbb{R}$-линейное отображение ядра L в ядро L_1. Оказалось, что это отображение можно перенести и на X- и Y- инварианты, хотя этот факт заранее не очевиден.

Теорема 4.1 ($\operatorname{Ker}_Z(L)$ под действием Z-преобразований Дарбу, $Z \in \{X, Y\}$)**.** *Пусть* $r_0 \in \operatorname{Ker}_X(L)$ *(соотв.* $q_0 \in \operatorname{Ker}_Y(L)$*), и* L_1 *– оператор полученный из оператора* L *соответствующим* X*- (соотв.* Y*-) преобразованием Дарбу, тогда* $\operatorname{Ker}_X(L)/\{r_0\} \to \operatorname{Ker}_X(L_1)$ *(соотв.* $\operatorname{Ker}_Y(L)/\{q_0\} \to \operatorname{Ker}_Y(L_1)$*) по следующей формуле:*

$$r \mapsto r + \left(\frac{r}{r_0}\right)_x \frac{r_0}{r_0 - r} \tag{12}$$

$$\left(\textit{соотв.} \quad q \mapsto q + \left(\frac{q}{q_0}\right)_y \frac{q_0}{q_0 - q}\right) .$$

Доказательство. Обозначим оператор L через его коэффициенты: (1). Пусть $r_0 \in \operatorname{Ker}_X(L)$, тогда

$$z_0 = f(y) e^{-\int b + r_0 \, dx} \in \operatorname{Ker} L \ ,$$

и мы можем выразить c через $r_0, a, f(y), b$. Подставим $M = D_x + r_0 + b$ и выражение для c в (2), где L_1 и M_1 тоже введем через коэффициенты: $L_1 = D_x D_y + a_1(x,y) D_x + b_1(x,y) D_y + c_1(x,y)$, $M_1 = D_x + m_{100}(x,y)$. Далее в доказательстве мы для краткости будем опускать обозначение зависимости коэффициентов от независимых переменных, например, будем писать a вместо $a(x,y)$.

Из полученного операторного равенства, сравнивая соответственные коэффициенты, последовательно выразим a_1, b_1, c_1, m_{100}. В частности, мы получим

$$m_{100} = r_0 + b - \frac{r_{0x}}{r_0} \ .$$

Пусть $r \in \mathrm{Ker}_X(L)/\{r_0\}$, тогда

$$z = g(y) e^{-\int b+r \ dx} \in \mathrm{Ker}\, L \ ,$$

и $M(z) \in \mathrm{Ker}\, L_1$. Заметим, что для $r = r_0$ мы получим $M(z) = 0$. Тогда X-инвариант оператора L_1 можно построить по формуле:

$$\tilde{r} = -b_1 - \frac{M(z)_x}{M(z)} \ . \qquad (13)$$

Упрощая это выражение, получим (12).

Утверждение для Y-инвариантов доказывается аналогично. □

Пример 4.2. Рассмотрим оператор

$$L = D_x D_y + 1 - x^2 - xy \ ,$$

и его X-инвариант

$$r_0 = x + y \ . \qquad (14)$$

Инварианты Лапласа оператора L равны: $h = k = -1 + x^2 + yx$.

Пусть L_1 – результат X-преобразования Дарбу соответствующего r_0. Согласно формуле (11), имеем $M = D_x + r_0 = D_x + x + y$. Результат такого Дарбу преобразования, оператор L_1 найдем из операторного равенства (2):

$$L_1 = D_x D_y - \frac{1}{x+y} D_y - x^2 - xy \ .$$

Его инварианты Лапласа (4) имеют вид

$$h_1 = x^2 + xy \ , \quad k_1 = \frac{x^4 + 3x^3y + 3x^2y^2 + y^3x + 1}{(x+y)^2} \ .$$

Пусть r – какой-то другой X-инвариант оператора L. Согласно Теореме 4.1, r_1, полученное по формуле

$$r_1 = \frac{-(x+y)r^2 + (x^2+2xy+y^2-1)r + r_x x + r_x y}{(x+y)(x+y-r)} \ . \tag{15}$$

является X-инвариантом оператора L_1.

Это можно и явно проверить. Для этого проверим выполнение равенства (7) для оператора L_1 (то есть при подстановке r_1, h_1, k_1 вместо r, h, k соответственно). Левая часть равенства (7) есть некоторое алгебраическо-дифференциальное выражение B зависящее от $r, x, y, r_x, r_y, r_{xx}, r_{xy}, r_{xxy}$.

Для его упрощения воспользуемся тем, что r - X-инвариант оператора L, а значит имеет место равенство (7). Получим

$$\frac{r^2 r_y - 2rx - ry - r_x + r_x x^2 + r_x xy - r_{xy} r + r_y r_x}{r^2} = 0 \ . \tag{16}$$

Далее используем стандартную для дифференциальной алгебры процедуру: из равенства (16) выразим r_{xy} через r, x, y, r_x, r_y, а затем, дифференцируя, это равенство по x и подставляя выражение для r_{xy}, получаем выражение для r_{xxy} через $r, x, y, r_x, r_y, r_{xx}$. Теперь подставим найденные выражения для r_{xy} и r_{xxy} в B. После упрощений получаем $B = 0$.

Теорема 4.3 ($\mathrm{Ker}_X(L)$ под действием Y-преобразований Дарбу)**.** *Пусть $q_0 \in \mathrm{Ker}_Y(L)$, и L_1 – оператор полученный из оператора L соответствующим Y-преобразованием Дарбу. Тогда отображение $\mathrm{Ker}_X(L)/\{r_0\} \to \mathrm{Ker}_X(L_1)$ задается формулой*

$$r \mapsto -\frac{q_{0x} + h - q_0 r}{q_0 - q} \ ,$$

где q – соответствующий r Y-инвариант оператора L, и r_0 – соответствующий q_0 X-инвариант оператора L.

Доказательство. Обозначим оператор L через его коэффициенты: (1). Коэффициент c можно выразить через инвариант h, (4). Подставим $M = D_y + q_0 + a$ и выражение для c в (2), где L_1 и M_1 тоже введем через коэффициенты: $L_1 = D_x D_y + a_1(x,y) D_x + b_1(x,y) D_y + c_1(x,y)$, $M_1 = D_x + m_{100}(x,y)$. Далее в доказательстве мы для краткости будем опускать обозначение зависимости коэффициентов от независимых переменных.

Из полученного операторного равенства, сравнивая соответственные коэффициенты, последовательно выразим a_1, b_1, c_1, m_{100}. В частности, мы получим

$$m_{100} = q_0 + a - \frac{q_{0y}}{q_0} \ .$$

Пусть $r \in \mathrm{Ker}_X(L)$, q – соответствующий r Y-инвариант оператора L, z – соответствующий элемент ядра L. Тогда $M(z) \in \operatorname{Ker} L_1$ и X-инвариант оператора L_1 можно построить по формуле (13). Полученное выражение,

$$\tilde{r} = -\frac{(ab + a_x + bq_0 + q_{0x})z + z_x q_0 + bz_y + z_x a + z_{xy}}{(a + q_0)z + z_y} \tag{17}$$

не упрощается так же просто как выражение для X-инварианта в доказательстве Теоремы 4.1.

Воспользуемся тем, что $z \in \operatorname{Ker} L$, выразим z_{xy} через производные z меньшего порядка и подставим в (17). Выразим производные z первого порядка через z используя связь между r и q:

$$z_x = -(b + r)z \ , \quad z_y = -(a + q)z \ , \tag{18}$$

и подставим в (17), и получим утверждение теоремы. □

Заключение

В данной статье мы полностью перенесли действие преобразований Дарбу в пространство инвариантов. Введены новые понятия X- и Y-инвариантов, которые обладают достаточно интересными свойствами, чтобы предполагать, что их дальнейшее изучение позволит прояснить многие проблемы символьных решений дифференциальных уравнений.

Действие классических преобразований Лапласа в пространстве инвариантов остается пока невыясненным.

Список литературы

[1] I. Anderson, N. Kamran, “The variational bicomplex for hyperbolic second-order scalar partial differential equations in the plane”, *Duke J. Math.*, **87** (1997), 265–319.

[2] L. Bianchi, “Lezioni di geometria differenziale”, *Bologna:Zanichielli*, 1923–1927.

[3] G. Darboux, “Leçons sur la théorie générale des surfaces et les applications géométriques du calcul infinitésimal”, *Gauthier-Villars*, **2** (1889).

[4] U. Dini, “Sopra una classe di equazioni a derivate parziali di second ordine con un numero qualunque di variabili”, *Atti Acc. Naz. dei Lincei. Mem. Classe fis., mat., nat.*, **4**:5 (1901), 121–178.

[5] U. Dini, “Sopra una classe di equazioni a derivate parziali di second ordine”, *Atti Acc. Naz. dei Lincei. Mem. Classe fis., mat., nat.*, **4**:5 (1902), 431–467.

[6] L. P. Eisenhart, “Transformations of surfaces”, *Princeton University Press*, 1923(2nd ed.-1962).

[7] A. Forsyth, “Theory of differential equations”, *Cambridge*, **VI** (1906).

[8] E. Goursat, “Leçons sur l’intégration des équations aux dérivées partielles du seconde ordre a deux variables indépendants”, *Paris*, **2** (1898).

[9] L. Pisati, “Sulla estensione del metodo di Laplace alle equazioni differenziali lineari di ordine qualunque con due variabili indipendenti”, *Rend. Circ. Matem. Palermo*, 1905.

[10] L. Petren, “Extension de la méthode de Laplace aux équations $\sum_{i=0}^{n-1} A_{1i}(x,y)\frac{\partial^{i+1}z}{\partial_x\partial_y^i} + \sum_{i=0}^{n} A_{0i}(x,y)\frac{\partial^i z}{\partial_y^i}$”, *Ph.D. thesis / Lund.*, 1911.

[11] J. L. Roux, “Extensions de la méthode de Laplace aux équations linéaires aux derivées partielles d’ordre supérieur au second”, *Bull. Soc. Math. de France*, **27** (1899), 237–262.

[12] S. P. Tsarev, “Generalized Laplace transformations and integration of hyperbolic systems of linear partial differential equations”, *ISSAC ’05: Proceedings of the 2005 international symposium on Symbolic and algebraic computation, ACM Press*, 2005, 325–331.

[13] S. P. Tsarev, “On factorization and solution of multidimensional linear partial differential equations”, *Proceedings of WSPC (In Honor of 60-th birthday of Sergei Abramov)*, 2007, 43–66.

[14] Ю. Ю. Берест, А. П. Веселов, “О сингулярностях потенциалов точно решаемых уравнений Шрёдингера и проблеме Адамара”, *УМН*, **53**:1(319) (1998), 211–212; *Russian Math. Surveys*, **53**:1 (1998), 208–209.

[15] А. П. Веселов, С. П. Новиков, “Точно решаемые периодические двумерные операторы Шредингера”, *УМН*, **50**:6(306) (1995), 171–172; *Russian Math. Surveys*, **50**:6 (1995), 1316–1317.

[16] А. П. Веселов, А. Б. Шабат, “Одевающая цепочка и спектральная теория оператора Шрёдингера”, *Функц. анализ и его прил.*, **27**:2 (1993), 1–21; *Funct. Anal. Appl.*, **27**:2 (1993), 81–96.

[17] А. В. Жибер, В. В. Соколов, “Точно интегрируемые гиперболические уравнения лиувиллевского типа”, *УМН*, **56**:1(337) (2001), 63–106; *Russian Math. Surveys*, **56**:1 (2001), 61–101.

[18] А. В. Жибер, С. Я. Старцев, “Интегралы, решения и существование преобразований Лапласа линейной гиперболической системы уравнений”, *Матем. заметки*, **74**:6 (2003), 848–857; *Math. Notes*, **74**:6 (2003), 803–811.

[19] С. Я. Старцев, “Метод каскадного интегрирования Лапласа для линейных гиперболических систем уравнений”, *Матем. заметки*, **83**:1 (2008), 107–118; *Math. Notes*, **83**:1 (2008), 97–106.

[20] Е. В. Ферапонтов, “Преобразования Лапласа систем гидродинамического типа в инвариантах Римана”, *ТМФ*, **110**:1 (1997), 86–97; *Theoret. and Math. Phys.*, **110**:1 (1997), 68–77.

[21] С. П. Царев, “О нелинейных уравнениях с частными производными, интегрируемых по Дарбу”, *Солитоны, геометрия, топология — на перекрестках*, Сборник статей. К 60-летию со дня рождения академика Сергея Петровича Новикова, Тр. МИАН, **225**, Наука, М., 1999, 389–399; *Proc. Steklov Inst. Math.*, **225** (1999), 372–381.

[22] С. П. Царев, Е. С. Шемякова, “Дифференциальные преобразования параболических операторов второго порядка на плоскости”, *Геометрия, топология и математическая физика. II*, Сборник статей. К 70-летию со дня рождения академика Сергея Петровича Новикова, Тр. МИАН, **266**, МАИК, М., 2009, 227–236; *Proc. Steklov Inst. Math.*, **266** (2009), 219–227.